

Plagiolepis pygmaea

(Latreille, 1798)

Una formica grande quanto la capocchia di uno spillo, amante del sole, che vive in reti di nidi con molte regine e si infila nella più piccola fessura.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

21–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–60 %

Nel nido



IBERNAZIONE

10–15 °C

nov – feb



VOLI NUZIALI

giu – ago



OPERAIE

1.3–2 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

3–4.5 mm

Più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 5000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Zuccheri

Insetti

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Ytong
2. Nido a Sandwich
3. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Offri lo zucchero come un velo di miele cristallizzato o su un minuscolo pezzetto di stagnola, e mantieni il cotone appena umido: una sola goccia o un tappo fradicio possono intrappolare o far annegare più operaie in un colpo solo.

ATTENZIONE

Pianifica la barriera antifuga prima che nascano le prime operaie e controlla ogni giunzione: le operaie si accalcano nel sottile spazio tra una provetta e il suo tappo o un tubo di collegamento, e gli allevatori italiani ne hanno perse molte lì, schiacciate quando la plastica si è espansa di nuovo dopo il riposo invernale o uccise per sbaglio all'apertura del tappo.