

Pogonomyrmex barbatus

(Smith, 1858)

Formica mietitrice rossa

Una grossa raccoglitrice di semi rossa dei deserti e delle praterie del sud-ovest, con una puntura dolorosa e colonie che vivono da 20 a 30 anni.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

26–32 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Granai dei semi: 30–50 %



IBERNAZIONE

12–16 °C

dic – feb



VOLI NUZIALI

giu – set

Dopo la pioggia, Giornate calde,
Tempo calmo



OPERAIE

6–10 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

11–13 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Raggiunge 10.000 operaie

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Medio


Metti una barriera antifuga
sull'outworld

L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi nell'areale d'origine della specie. Il meteo decide i giorni esatti, e le colonie allevate in casa possono seguire un ritmo diverso.

Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Semi

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Setup naturalistico
2. Nido in Ytong
3. Nido in Acrilico

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Accumula semi, quindi un pasto saltato non è un problema
- ⚠ Operaie curiose: metti una barriera antifuga sull'outworld
- ⚠ Ha bisogno di un gradiente di umidità, con granai asciutti e camere della covata umide
- ⚠ Le colonie diventano enormi e hanno bisogno di spazio per espandersi
- ⚠ Le operaie possono pungere

Note degli allevatori

CONSIGLIO

Il calore è ciò che le fa crescere. Tieni l'estremità calda del nido a circa 30 °C con un cavo o un tappetino riscaldante e lascia il resto del nido più fresco. I venditori riferiscono che la covata si sviluppa molto più lentamente sotto i 24 °C circa e che le colonie crescono a malapena a normale temperatura ambiente.

ATTENZIONE

L'acqua e miele da sola non basta. Un allevatore ha dato a otto giovani colonie solo acqua e miele e ha visto la covata ridursi, e gli è stato consigliato di mettere a disposizione semi frantumati e di dare insetti due o tre volte a settimana. Offri semi piccoli come fiancola dei prati, tarassaco o chia, ed elimina quelli che germogliano o ammuffiscono.