

# Camponotus cruentatus

(Latreille, 1802)

## Formiga-carpinteira

Uma gigante mediterrânea de um preto opaco, com uma faixa vermelho-ferrugem no gáster, tímida enquanto é pequena e ferozmente territorial quando a colônia cresce.



Foto: Jonghyun Park, CC BY 4.0



### Num relance



TEMPERATURA DO NINHO  
**25–30 °C**

No ninho



UMIDADE DO NINHO  
**40–60 %**

No ninho



HIBERNAÇÃO  
**10–15 °C**

nov. – fev.



VOOS NUPCIAIS  
**jun. – jul.**

Dias quentes, Tempo calmo



OPERÁRIAS  
**6–10 mm**

maiores de até 15 mm



RAINHA  
**15–18 mm**

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA  
**Chega a 3.000 operárias**

Crescimento: Rápido




RISCO DE FUGA  
**Médio**

Mantenha uma barreira antifuga no outworld




### O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.



### Tamanhos na mesma escala



### Cuidados num relance

#### ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

#### MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

#### POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld



### Notas de criadores

#### DICA

Ofereça uma ponta quente e outra mais fresca, por exemplo com um tapete térmico ao longo de um dos lados do ninho. A colônia leva a cria para o calor, e vários criadores viram o desenvolvimento estagnar em um ninho que ficou frio.

#### ATENÇÃO

Mantenha o outworld seco e dê ao ninho uma câmara úmida. Criadores perderam operárias e tiveram mofo em ninhos que eram umedecidos com frequência demais, mas um criador atribuiu a um ninho quase seco o fato de a rainha pôr pouquíssimos ovos, e umedecê-lo de novo ajudou.