

Lasius alienus

(Foerster, 1850)

Uma Lasius pequena, marrom e tímida, de campos secos e quentes e de solos calcários, fácil de confundir com a formiga-preta-de-jardim.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

Num relance



TEMPERATURA DO NINHO
21–25 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO
50–60 %

No ninho



HIBERNAÇÃO
5–8 °C

out. – mar.



VOOS NUPCIAIS
jul. – set.



OPERÁRIAS
2–4 mm

Todas do mesmo tamanho



RAINHA
7–9 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA
Chega a 5.000 operárias


Crescimento: Moderado



RISCO DE FUGA
Médio


Mantenha uma barreira antifuga no outworld

O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

MELHORES NINHOS

1. Ninho Sanduíche
2. Ninho de Ytong
3. Ninho de Acrílico

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld
- ⚠ Exige uma hibernação fria, por exemplo na geladeira

Notas de criadores

DICA

Os cuidados são muito parecidos com os de Lasius niger: a rainha claustral não precisa de comida até as primeiras operárias nascerem; depois, ofereça água com açúcar ou mel e pequenos insetos, como moscas-das-frutas. Em um relato de criação alemão, as operárias levavam pequenas presas para o ninho sem hesitar, mas, depois das primeiras semanas, só visitavam o mel de vez em quando.

ATENÇÃO

Confira a identificação antes de fazer planos com base nela. As rainhas fundadoras se confundem facilmente com Lasius niger, e membros experientes de fóruns dizem que essa formiga não pode ser identificada por fotos. Espere surgirem operárias de tamanho normal e examine várias delas sob uma lupa forte, pois as minúsculas primeiras operárias têm menos pelos. Até lá, chame a colônia de Lasius cf. alienus.