

Manica rubida

(Latreille, 1802)

Uma grande caçadora de montanha, vermelho-ferrugem, que amontoa montes em forma de cratera ao redor das entradas do ninho, ferroa como uma vespa e não perdoa erros na fase de fundação.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



Num relance



TEMPERATURA DO NINHO
20–28 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO
50–70 %

No ninho



HIBERNAÇÃO
5–10 °C

out. – mar.



VOOS NUPCIAIS
abr. – jun.

Dias quentes



OPERÁRIAS
5–9 mm

Todas do mesmo tamanho



RAINHA
10–13 mm

Uma ou mais rainhas



TAMANHO DA COLÔNIA
Chega a 3.000
operárias

Crescimento: Rápido




RISCO DE FUGA
Médio

Mantenha uma barreira antifuga no outworld




O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.



Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Açúcar

Insetos

MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Setup naturalista
3. Setup de Tubo de Ensaio

POR QUE ESSA NOTA

- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld
- ⚠ Semiclaustral: a rainha fundadora precisa ser alimentada
- ⚠ As operárias podem ferroar



Notas de criadores

DICA

Ofereça um gradiente do úmido ao bem seco em vez de um ninho encharcado. Um criador que deu a uma colônia três câmaras, de molhada a quase seca, a encontrou vivendo na mais seca, mas colônias pequenas também são muito sensíveis a um ninho que seca.

ATENÇÃO

As rainhas fundadoras caçam por conta própria, então garanta que elas tenham acesso a comida desde o primeiro dia: um outworld pequeno ou uma alimentação muito regular e, quando as primeiras larvas aparecerem, um pedaço pequeno de proteína que ela consiga carregar pelo menos uma vez por dia. Criadores que criaram muitas colônias alimentam uma ou duas vezes por dia nessa fase.