

Messor ebeninus

Santschi, 1927

Uma colhedora de um preto-ébano brilhante do Oriente Médio, que guarda as sementes no andar de cima e mantém a cria na terra úmida, bem lá embaixo.



Foto: Moshe Neeman (משה נאמן, moshe_neeman), CC BY 4.0



Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

22–28 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO

50–60 %

Celeiros de sementes: 30–50 %



HIBERNAÇÃO

15–18 °C

jan. – fev.



VOOS NUPCIAIS

nov. – dez.

Depois da chuva



OPERÁRIAS

4–8 mm

majores de até 10 mm



RAINHA

11–12 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

Chega a 5.000 operárias

Crescimento: Moderado




RISCO DE FUGA

Baixo

Formigas calmas, que raramente tentam fugir




O ano num relance



Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.



Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Sementes

Insetos

Açúcar

MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Operárias calmas, que raramente tentam fugir
- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ✓ Guarda sementes, então uma alimentação esquecida não é problema
- ⚠ Precisa de um gradiente de umidade, com celeiros secos e câmaras de cria úmidas



Notas de criadores

DICA

Copie os dois andares do ninho selvagem: uma parte superior seca para o estoque de sementes e uma parte inferior úmida para a rainha e a cria. Em um ninho de Ytong ou de gesso, umedeça apenas uma ponta e deixe a outra seca.

ATENÇÃO

Uma rainha capturada depois do voo de outono só põe ovos no fim do inverno, então um tubo sem ovos por meses é normal. Uma colônia jovem cresce então devagar: nesse estudo, ela tinha apenas algumas dezenas de operárias no outono seguinte.