

# Messor structor

(Latreille, 1798)

Uma colhedora marrom, de pele áspera, que divide o ninho com muitas rainhas e se espalha soltando novas colônias por brotamento.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0



## Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

**22–28 °C**

No ninho



UMIDADE DO NINHO

**50–70 %**

Celeiros de sementes: 30–50 %



HIBERNAÇÃO

**8–12 °C**

nov. – fev.



VOOS NUPCIAIS

**abr. – jun.**



OPERÁRIAS

**4–8 mm**

majores de até 10 mm



RAINHA

**9–11 mm**

Várias rainhas



TAMANHO DA COLÔNIA

**Chega a 5.000 operárias**

Crescimento: Rápido




RISCO DE FUGA

**Baixo**

Formigas calmas, que raramente tentam fugir




## O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.



## Tamanhos na mesma escala



## Cuidados num relance

### ALIMENTAÇÃO

Sementes

Insetos

Açúcar

### MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

### POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Operárias calmas, que raramente tentam fugir
- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ✓ Guarda sementes, então uma alimentação esquecida não é problema
- ⚠ Precisa de um gradiente de umidade, com celeiros secos e câmaras de cria úmidas



## Notas de criadores

### DICA

Comece com uma rainha que venha com operárias ou junte várias rainhas. Criadores franceses relatam que rainhas solitárias muitas vezes não conseguem fundar uma colônia em cativeiro, porque a espécie parece iniciar novos ninhos principalmente por brotamento.

### ATENÇÃO

As operárias cavam no concreto aerado e no gesso, principalmente quando falta espaço. Cubra um ninho de Ytong com argamassa, cola de azulejo ou reboco de resina, ou use acrílico, e nunca deixe paredes finas.