

Messor wasmanni

Krausse, 1910

Uma colhedora de sementes de cabeça grande dos campos ensolarados da Itália e dos Bálcãs, com trilhas organizadas até o ninho e um nome que ainda se escreve com um cauteloso cf.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

Num relance



TEMPERATURA DO NINHO

22–26 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO

50–70 %

Celeiros de sementes: 30–50 %



HIBERNAÇÃO

12–15 °C

dez. – fev.



VOOS NUPCIAIS

set. – nov.

Depois da chuva



OPERÁRIAS

4–8 mm

majores de até 10 mm



RAINHA

12–14 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA

Chega a 5.000 operárias

Crescimento: Moderado




RISCO DE FUGA

Baixo


Formigas calmas, que raramente tentam fugir

O ano num relance



Meses para a Europa temperada e o Mediterrâneo. O clima decide os dias exatos, então os voos podem acontecer mais cedo ou mais tarde onde você mora.

Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Sementes

Insetos

Açúcar

MELHORES NINHOS

1. Ninho de Ytong
2. Ninho de Acrílico
3. Setup naturalista

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Operárias calmas, que raramente tentam fugir
- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ✓ Guarda sementes, então uma alimentação esquecida não é problema
- ⚠ Precisa de um gradiente de umidade, com celeiros secos e câmaras de cria úmidas

Notas de criadores

DICA

Ofereça de vez em quando espigas inteiras de gramíneas, e não só sementes soltas: na natureza, essas formigas colhem sementes direto da planta, além de pegá-las do chão.

ATENÇÃO

Uma rainha capturada depois do voo de outono costuma começar a pôr ovos só na primavera, depois do descanso de inverno, então um tubo de ensaio com aparência vazia durante todo o inverno é normal. Mantenha-o escuro e silencioso em vez de ficar conferindo a rainha.