

Pogonomyrmex barbatus

(Smith, 1858)

Formiga-ceifeira-vermelha

Uma grande colhedora de sementes vermelha dos desertos e pradarias do sudoeste, com uma ferroada dolorosa e colônias que vivem de 20 a 30 anos.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0

Num relance



TEMPERATURA DO NINHO
26–32 °C

No ninho



UMIDADE DO NINHO
50–70 %

Celeiros de sementes: 30–50 %



HIBERNAÇÃO
12–16 °C

dez. – fev.



VOOS NUPCIAIS
jun. – set.

Depois da chuva, Dias quentes,
Tempo calmo



OPERÁRIAS
6–10 mm

Todas do mesmo tamanho



RAINHA
11–13 mm

Uma rainha



TAMANHO DA COLÔNIA
Chega a 10.000
operárias


Crescimento: Moderado



RISCO DE FUGA
Médio


Mantenha uma barreira antifuga no outworld

O ano num relance



Meses na área de distribuição natural da espécie. O clima decide os dias exatos, e colônias criadas em casa podem seguir outro ritmo.

Tamanhos na mesma escala



Cuidados num relance

ALIMENTAÇÃO

Sementes

Insetos

Açúcar

MELHORES NINHOS

1. Setup naturalista
2. Ninho de Ytong
3. Ninho de Acrílico

POR QUE ESSA NOTA

- ✓ Totalmente claustral: a rainha não precisa de comida até as primeiras operárias chegarem
- ✓ Guarda sementes, então uma alimentação esquecida não é problema
- ⚠ Operárias curiosas: mantenha uma barreira antifuga no outworld
- ⚠ Precisa de um gradiente de umidade, com celeiros secos e câmaras de cria úmidas
- ⚠ As colônias ficam enormes e precisam de espaço para crescer
- ⚠ As operárias podem ferroar

Notas de criadores

DICA

O calor é o que as faz crescer. Mantenha a ponta quente do ninho a cerca de 30 °C com um cabo de aquecimento ou um tapete térmico e deixe o resto do ninho mais fresco. Os vendedores relatam que a cria se desenvolve muito mais devagar abaixo de cerca de 24 °C e que as colônias quase não crescem em temperatura ambiente comum.

ATENÇÃO

Água com mel sozinha não basta. Um criador alimentou oito colônias jovens só com água com mel, viu a cria diminuir e ouviu o conselho de deixar sementes trituradas à disposição e dar insetos duas a três vezes por semana. Ofereça sementes pequenas, como Kentucky bluegrass, dente-de-leão ou chia, e retire as que brotarem ou mofarem.